

Άρθρο 67α⁽¹⁾

Ταυτοποίηση αμιγών ελληνικών μελιών πεύκου, ελάτης, καστανιάς, ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου

- 1) Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των αμιγών τύπων ελληνικού μελιού πεύκου, ελάτης, καστανιάς, ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου, φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Παράμετρος	ΠΙΝΑΚΑΣ							
	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΙΟΥ							
	Πεύκο	Έλατο	Καστανιά	Ερείκη	Θυμαρί	Πορτοκαλιά	Βαμβάκι	Ηλίανθος
Υγρασία (%)		≤ 18,5						
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (Ms/cm)	≥0,9	≥1,0	≥1,1		≤0,6	≤0,45		
Κύριος γυρεόκοκκος % των γυρεοκόκκων των νεκταρογόνων φυτών			≥87	≥45	≥18*	≥3	≥3	≥20
HDE/P**	Ποικίλλει	Ποικίλλει						
PK/10g***	Ποικίλλει	Ποικίλλει						
	Σημαντική παρουσία χαρακτηριστικών στοιχείων μελπωματών (μύκητες - καπνίες)	Απλή παρουσία χαρακτηριστικών στοιχείων μελπωματών (μύκητες)	≥100.000		< 90.000	< 70.000	< 90.000	< 55.000

* Το ποσοστό των συνοδών γυρεοκόκκων ενός είδους φυτού δεν πρέπει να ξεπερνά το 45%.

**Honeydew elements/Pollen (στοιχεία μελπωματών/γυρεόκοκκοι νεκταρογόνων φυτών)

*** PK/10g: Συνολικός αριθμός γυρεοκόκκων/10 g.

- 2) Η επισήμανση της φυτικής προέλευσης των αμιγών τύπων ελληνικών μελιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1, μπορεί να γίνει, μόνο αν αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές τους παραμέτρους, όπως αυτές ορίζονται στον εν λόγω πίνακα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι τιμές των παραμέτρων που αναφέρονται στο παράρτημα II του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων.

Παραπομπές

⁽¹⁾ Απόφ. ΑΧΣ 127/04, ΦΕΚ 239/Β/23.2.05 «Προσθήκη άρθρου 67α στον Κώδικα Τροφίμων «Ταυτοποίηση αμιγών ελληνικών μελιών πεύκου, ελάτης, καστανιάς, ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού, ηλίανθου».

